GD, Postbus 9, 7400 AA Deventer, info@gddeventer.com, www.gddeventer.com

voor gezonde dieren

Vaccinatiemogelijkheden binnen de wettelijke kaders voor Vleeskalkoenen

Alle vaccinaties dienen uitgevoerd te worden conform de in de registratiebeschikking vastgelegde enttijdstippen, methoden en doseringen.

NCD
Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006, geldend vanaf 22 oktober 2006:
De dieren worden in de periode van 72 uur na de geboorte tot de achttiende levensdag ten minste eenmaal gevaccineerd. Alle koppels van 10 weken of ouder, die worden verplaatst naar een ander pluimveebedrijf, worden 7 tot 42 dagen vóór het vervoer gevaccineerd met een levend vaccin d.m.v. spray of aërosol. Een koppel dat jonger dan 10 weken (over de openbare weg) wordt verplaatst krijgt ook een tweede vaccinatie met levend vaccin tussen 7 en 42 dagen vóór het vervoer.

Deze verplichte vaccinatie kan worden uitgevoerd door middel van injectie, spray, aërosol, oogdruppel of via het drinkwater. Bij een eenmalige vaccinatie gaat de voorkeur uit naar aërosol.
Extra vaccinaties zijn noodzakelijk om aan de titereis te voldoen..
Om na te gaan of een koppel voldoende weerstand heeft tegen NCD is op een leeftijd van 13 weken een bloedonderzoek verplicht. Indien niet aan de verlichte titer eis wordt voldaan dienen de vaccinaties van de volgende koppel worden uitgeveord door de aan het bedrijf gekoppelde dierenarts. Indien dan nog niet aan de eisen wordt voldaan is een verplichtend schema, uitgevoerd door de dierenarts, van toepassing

Verplicht schema op bedrijf waar bij herhaling niet voldoende weerstand wordt gemeten:

10–15 dagen	levend, Clone 30	spray/aërosol/ drinkwater
28–35 dagen	levend, Clone 30 of La Sota	spray/aërosol/ drinkwater
8–10 weken	levend, Clone 30 of La Sota	spray/aërosol/ drinkwater
16 weken hanen	levend, Clone 30 of La Sota	spray/aërosol/ drinkwater

TRT (Turkey Rhinotracheitisvirus of Aviair Metapneumovirus, AMPV)
Geadviseerd wordt een tweemalige vaccinatie uit te voeren. De eerste vaccinatie op de eerste levensdag of in de derde week. De tweede vaccinatie 3–5 weken na de eerste. Toediening d.m.v. spray met een grove druppel of d.m.v. oogdruppel. Het gebruik van een geïnactiveerde entstof, in combinatie met NCD, is te overwegen.

Vogelcholera (P. multocida)
Geadviseerd wordt een eenmalige vaccinatie of een tweemalige vaccinatie met een interval van 8 weken:

6 weken (1x)	dood	injectie, strikt s.c.

Het uitvoeren van deze enting is afhankelijk van de infectiedruk op het bedrijf.

Vlekziekte (E. rhusiopathiae)
Geadviseerd wordt een tweemalige vaccinatie met een interval van vier weken:

vanaf 6 weken	dood	injectie, s.c.
4 weken later	dood	injectie, s.c.

Het uitvoeren van deze enting is afhankelijk van de infectiedruk op het bedrijf.

Hemorragische enteritis (HE)
In Nederland is geen vaccin tegen HE geregistreerd. Als de infectiedruk het nodig maakt is het mogelijk om een vaccin uit een andere EU-lidstaat, waar wel een toelating geldt, te importeren en hier toe te passen.

GD, Postbus 9, 7400 AA Deventer, info@gddeventer.com, www.gddeventer.com

voor gezonde dieren

Vaccinatiekaart voor Vleeskalkoenen

Bedrijf en koppelgegevens

Naam	
Adres	
Woonplaats	
UBN	
KIPnr.	
EU-nr.	
Bedrijfsadres	
Vestigingsplaats	
Dierenarts	
Telefoon	
Bedrijfsadviseur	
Telefoon	
Broederij	
Fokbedrijf	
Merk	
Geboortedatum	
Aantal	
Stalnummer(s)	
Koppelnummer	

Entschema

Leeftijd	Ziekte	Entstof	Toe-dienings-wijze	Entstof Fabrikant	Batch nummer	Datum enting	Toedienings-wijze	Paraaf Pluimveehouder/ Dierenarts
1e dag	TRT	levend	spray					
10 dagen	NCD	levend	spray					
4 weken	NCD	levend	aërosol					
5 weken	TRT	levend	spray					
14 weken (hanen)	NCD	levend	aërosol					